Mycologie

Chapois (Commune de Ciney)
Le 15 septembre 2026

Guide : Lambert Lecoq
Rapporteur : Marc Paquay
Présents : 12 participants
Météo : temps chaud et ensoleillé..

Description du site

Lambert nous emmène aujourd'hui dans un petit vallon situé près de Chapois-Leignon, à la limite entre le Condroz et la Famenne. Nous avions déjà visité cet endroit le 7-11-2024. En première partie, nous explorons une prairie humide incluse dans la Réserve Naturelle Domaniale de « Marie Mouchon ». Cette réserve bocagère est gérée par le DNF avec l'aide d'un éleveur local qui y procède à un pâturage extensif. Nous entrons dans la prairie clôturée, un ruisselet s'écoule au milieu, le ruisseau des Cresses.



Après le pique-nique, nous parcourons les digues des deux étangs de Happe et le pied du talus boisé (ligne verte sur la carte).

Le sous-sol appartient à l'étage famennien avec la formation d'Esneux (grès à intercalations silteuses).

Espèces rencontrées dans la prairie et au bord du ruisseau


Nous espérons trouver des champignons malgré la sécheresse très sévère que nous subissons cette année …
La recherche commence. Grâce au nombre de paires d'yeux, nous trouvons un peu : *Xerocomus armeniacus, Marasmius rotula, Schizophyllum commune* et *Skeletocutis nivea* sur des branches de chêne, *Coprinus lagopus* sur des herbes coupées, *Amanita rubescens*, *Xerula radicata, Hebeloma theobrominum* (ex. *H. truncatum*), Collybia dryophila, *Fomes fomentarius*, une plutée indéterminée, *Mycena leptocephala* (à légère odeur chlorée), un lactaire que nous attribuons, avec quelques réserves, à *Lactarius roseozonatus var. flexuosus*, *Tyromyces chioneus*, un bel exemplaire typiquement grisonnant, *Megacollybia platyphylla*, *Lactarius torminosus* (lié au bouleau) et *Lactarius pyrogallus* (lié au noisetier), *Cortinarius triumphans*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Russula chloroides*.

Au bord du ruisseau, Charles ramasse une petite amanite. Influencés par sa très petite taille, son habitat, la présence de petits flocons sur le stipe et une plaque vélaire au disque, nous évoquons la rare *Amanita friabilis* … Après vérification, il ne s'agit nullement de cette espèce car la volve est membraneuse (et non « floconneuse ») de même que la plaque vélaire sur le chapeau. Il s'agira en fait d'une *Amanitopsis* du groupe *vaginata* et, peut-être, *A. olivaceogrisea*. On notera que ce dernier taxon est indiqué en synonymie invalide comme « *Amanita pseudofriabilis* » …



Espèces rencontrées en bordure des étangs et au pied du talus boisé

Nous cueillons des paxilles aux teintes rouges cuivrées, sombres et sans marge cannelée. Macroscopiquement, nous y voyons *Paxillus cupreus* tel que décrit dans le nouveau volume de Courtecuisse. Nous retrouvons quelques espèces communes vues le matin ainsi que des russules pectinées (*Russula pectinata*), assez fraîches et typiques. Dans l'herbe de la digue, nous notons *Bovista plumbea*. Plus loin, au bord de l'étang jouxtant un peuplement de douglas, nous trouvons : *Russula atropurpurea*, *Russula grisea*, *Lactarius piperatus*, un cortinaire du groupe de *Cortinarius hinnuleus, Collybia peronata*, toute sèche, *Peniophora quercina* sur branches tombées de chêne, *Hypholoma lateritium,* un très beau *Phaeollus schweinitzii* , frais, parasitant les racines des douglas et Russula chloroides, caractérisée par un cerne vert pâle au sommet du pied.


Phaeolus schweinitzi

Nous terminons la sortie et nous faisons le bilan : une quarantaine d'espèce auront été vues ce qui n'est pas si mal par cette sécheresse exceptionnelle …