Comptes-rendus d'activités SNNL 2016

6)- 13 juin 2016 : Carsambre Floreffe 2

Parcours du bas de la carrière.
Météo menaçante mais sèche, 20°.
11 participants, guide André Smoos.
Le circuit se situe dans le carré IFBL G54442.
La première visite a eu lieu en 2015, le 24 septembre (voir compte-rendu 11).
Nous avons souhaité revoir le site à une époque plus printanière.



Sans beaucoup nous déplacer, nous avons déterminé plusieurs poacées, refusant de baisser les bras face à cette famille réputée difficile.
Arrhenatherum elatius, Brachypodium sylvaticum, Bromus erectus, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Elymus caninus, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Holcus lanatus, Poa annua, Poa pratensis, Poa trivialis, Poa nemoralis, Vulpia myuros, soit 14 espèces qui n'ont plus de secrets pour nous ☺.

Nous avons hésité sur la détermination de *Vulpia myuros*, tant elle était grande. De plus, une partie des glumes inférieures atteignaient près de la moitié de la supérieure bien que la plupart étaient bien plus courtes. Toutefois, la glume supérieure n'avait qu'une nervure, ce qui a fait pencher la balance vers *V. myuros* et non *V. bromoides*.

Parmi les observations, une mousse, très présente, se faisait toute belle pour ne pas passer inaperçue. Avec une saison aussi humide, elle a gardé sa pleine forme.
Il s'agit de *Ditrichum flexicaule*, assez commune sur nos rochers et pelouses calcaires.

Le site recèle sept espèces d'Epervières, nous en avons vu cinq.
Revu *Hieracium piloselloides* du sous-genre *Pilosella* muni de stolons.
Nous avons séché sur le groupe de *H.murorum. Hieracium glaucinum* est reconnaissable à la couleur glauque des feuilles, la face supérieure maculée. Les poils denticulés sur le bord du limbe éliminent

H. schmidtii. La couleur des styles, ici jaunes, n'est pas suffisamment discriminante. Nous aurions aimé voir les rares et minuscules glandes dont question dans les flores.



Poils denticulés

Nous sommes toujours séduits à la découverte d'orchidées :



Ophrys apifera

Vu aussi Epipactis helleborine.



Genista tinctoria



Pimpinella saxifraga var. *dissectifolia* (Syn : var. *seselifolia*)

Les feuilles basilaires du Petit boucage sont souvent divisées de 2 à 4 fois en segments lancéolés-linéaires ce qui définit la variété *dissectifolia*.

Pour être plus complet, il serait nécessaire de parcourir les dessus de la carrière pour découvrir les pelouses du sommet et les terrasses. Nous pourrons y revenir.

Espèces supplémentaires à la liste précédente :
Alopecurus pratensis, Arctium nemorosum, Bromus hordeaceus, Carex muricata, Cerastium fontanum, Elymus caninus, Epilobium montanum, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Lapsana communis, Matricaria discoidea, Matricaria recutita, Papaver dubium, Papaver rhoeas, Poa nemoralis, Poa trivialis, Rumex conglomeratus, Scrophularia nodosa, Sonchus asper, Vulpia myuros.

André Smoos.

André SMOOS

0032473614750 Mobile
003281441046 Domicile
andre.smoos@skynet.be

Rue de la Chapelle Lessire, 63
B-5020 Malonne (Namur)
Belgique