Comptes-rendus d'activités SNNL 2015

10)- 12 août 2015 : étang à Warnant

Temps de nouveau très chaud.
6 participants, guide Richard Bergen.
Le circuit se situe dans les carrés IFBL H52632.



Cet étang se trouve juste en face de l'ancienne gare de Warnant.

Le site n'est repris dans aucun répertoire. Il s'agit d'une ancienne peupleraie dans une propriété privée. Les arbres ont été abattus, les souches arrachées et le sol étrépé. Un étang a été ainsi créé, les terres ayant été repoussées sur le côté. La technique utilisée s'écarte des méthodes traditionnelles. En effet, ici, le plan d'eau n'a qu'une faible profondeur et il n'y a aucune berge abrupte. Les eaux étant basses à cette saison, de belles plages de terre en pente douce laisse apparaître le sol argileux. Le milieu ouvert et débarrassé de presque toute végétation arbustive a permis le développement d'une flore herbacée qui a profité du terrain libre.

Le pourtour de la pièce d'eau s'est peuplé d'espèces des terrains humides et du bord des eaux, tandis que les parties plus sèches sont envahies par les friches semblables à celles rencontrées sur les abords du Ravel tout proche. Ces contrastes sont toujours enrichissants pour nos esprits curieux.

En découvrant cette situation, nous sommes bien conscients que cet état du lieu ne pourra perdurer ainsi. Déjà les massettes occupent une bonne longueur de rive. Vu la faible profondeur de l'eau, elles ne vont pas tarder à tout envahir sans doute accompagnées de roseaux et de joncs. Il nous restera encore quelques années pour espérer observer de ces petites plantes qui font la joie de leurs découvreurs. Sans doute que des graines seront

apportées par des oiseaux comme le Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) qui nous a fait une jolie démonstration de son vol.

Actuellement, nous avons noté sur ces plages, quelques espèces classiques des bords d'étangs comme *Alisma plantago-aquatica, Lycopus europaeus, Juncus articulatus, Solanum dulcamara, Lythrum salicaria*, annonçant *Phragmites australis* non encore apparu ; une plantule de graminée n'a pas été déterminée.

Dans l'eau, *Potamogeton pectinatus*.

Un peu plus haut sur la rive : *Mentha aquatica, Juncus effusus* et sa var. *subglomeratus*. Celle-ci montre une inflorescence contractée telle que celle de *Juncus conglomeratus*. La tige de celui-ci est striée contrairement à l'autre qui est lisse. C'est le seul caractère sur lequel nous nous sommes basés. Nous aurions dû, en plus, vérifier la base de la bractée prolongeant la tige à marges enroulées et le dessus de la capsule avec le reste du style implanté sur une petite dépression plutôt que sur une protubérance chez *J. conglomeratus*. *Juncus inflexus* fut plus facile à reconnaître.

Ensuite vient le cortège des plantes plus fortes qui s'installent sur ces terrains mouilleux : *Scrophularia aquatica, Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, Hypericum quadrangulum*.

D'autres espèces profitent de l'humidité générée par la proximité du plan d'eau : *Rumex conglomeratus, Carex hirta, Deschampsia cespitosa*.

D'autres encore, plus nitrophiles se mêlent aux friches toutes proches : *Epilobium parviflorum, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Angelica sylvestris, Lysimachia nummularia.*

Les friches qui entourent la pièce d'eau se sont développées sur un sol fraîchement remanié par les engins de terrassement dont on perçoit encore les traces jusque dans l'eau. S'y retrouvent des espèces communes : *Hypericum perforatum, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Dipsacus fullonum, Ajuga reptans, Poa annua, Tussilago farfara, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Teucrium scorodonia, Equisetum arvense.*


Nous avons traversé un terrain, destiné à la construction d'une entreprise, situé dans un petit zoning. Une friche s'y est installée offrant à la vue une jolie couverture fleurie. On y note un mélange d'espèces rudérales nitrophiles des prairies ou des terrains cultivés : *Melilotus albus, Galeopsis tetrahit, Vicia hirsuta, Vicia tetrasperma, Stellaria graminea, Pastinaca sativa, Fallopia convolvulus, Myosotis arvensis, Lotus corniculatus, Chenopodium album, Viola arvensis, Valeriana repens, Odontites vernus.*

En longeant le Ravel, l'apport d'un ballast calcaire filtrant facilite l'implantation de : *Clematis vitalba, Lathyrus sylvestris, Echium vulgare, Origanum vulgare, Scabiosa columbaria, Senecio jacobea, Galium verum, Carex muricata subsp. pairae, Picris hieracioides*. Sur le talus, sans doute constitué de cendrées, nous déterminons *Hieracium sabaudum* qui préfère les terrains plus acides.

Deux espèces moins connues ont été déterminées de plus près : *Odontites vernus et Fallopia convolvulus.*



Odontites vernus





Fallopia convolvulus



Détail des tépales entourant les akènes

Les photos sont d'André Smoos.

André Smoos.

André SMOOS

0032473614750 Mobile
003281441046 Domicile
andre.smoos@skynet.be

Rue de la Chapelle Lessire, 63
B-5020 Malonne (Namur)
Belgique