Rapport d'activités SNNL 2014

4)- 15 avril 2014 : Dave : dessus des rochers de Néviau

Parcours du sentier qui surplombe les rochers de Néviau à Dave.
Temps clément et flore variée.
14 participants, guide André Smoos.
Le parcours se situe dans le carré IFBL G54731.


photo Claude Delhaise

Les rochers de Néviau se situent au bord sud du synclinorium de Namur et rappellent ceux de Marche-les-Dames par leur aspect ruiniforme à cause de leur dolomitisation. Le synclinal entre les deux sites est déversé et faillé (zone failleuse du Midi). Au sud de ce massif calcaire, les grès du Famennien affleurent et nous verrons le contraste de la végétation entre les terrains calcaires et siliceux.


photo Claude Delhaise

Feuille de *Hypericum perforatum*

Nous démarrons de la chapelle N.D. de Bon-Secours et nous déterminons quelques espèces communes le long de la route N947 :
Centranthus ruber, Valerianella (locusta), Bromus sterilis, Chelidonium majus, Veronica persica, V. hederifolia, Plantago lanceolata, P. major, Hypericum perforatum, Ranunculus repens, Glechoma hederacea, Veronica montana. Lamium maculatum a un pétale en casque avec deux plis longitudinaux bien marqués.
Les espèces mises entre parenthèses demandent vérification à cause de caractères observés insuffisants.



photo André Smoos

Lamium maculatum

Nous abordons la montée où affleure bientôt le grès famennien. Le versant est exposé sud-ouest. *Allium ursinum* couvre de belles surfaces et il remonte à la faveur de coulées de colluvionnement. Egalement pour *Lamium galeobdolon. Luzula sylvatica* indique la nature du sous-sol avec *Lonicera periclymenum, Pteridium aquilinum, Sorbus aucuparia, Betula pendula.*



photo Claude Delhaise

Luzula sylvatica

Famille des Joncacées. Les luzules se distinguent par : absence de ligule, gaines entières (= fermées) à gorge velue; feuilles à bords velus; pas de lobes apicaux aux gaines (Willy Fasseaux)

D'autres espèces forestières : *Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Phyteuma (nigrum), Stachys sylvatica, Deschampsia cespitosa, D. flexuosa, Stellaria holostea, Euphorbia amygdaloides.*

Sur notre gauche, côté Meuse, le sous-sol calcaire se fait connaître *: Vinca minor, Orchis mascula, Primula veris, Asplenium scolopendrium.* Mais c'est au-dessus des rochers que nous découvrons les espèces dont l'épanouissement profite d'une gestion menée par le Club Alpin Belge (CAB). Quelques ares de crête rocheuse ont été dégagés et mis à blanc. Des arbustes de lisières *: Acer campestre, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare* et le rare *Cotoneaster integerrimus.*

La flore herbacée est déjà bien fleurie : *Sesleria caerulea, Origanum vulgaris, Lepidium campestre, Gallium mollugo, Lithospermum officinale, Helianthemum nummularium, Erophila verna, Sanguisorba minor, Cardaminopsis arenosa, Arenaria serpyllifolia, Ajuga reptans, Vincetoxicum hirundinaria, Hieracium murorum, Sedum album, Campanula persicifolia, Silene dioica, Festuca pallens et Polygonatum odoratum.*


photo André Smoos

Feuilles de Primula : à gauche veris, à droite elatior

Note :
Poa nemoralis - Poa gracile remarquable par le port de feuilles redressées au-dessus de l'horizontale, ce qui fait utiliser le moyen mnémotechnique "Heil Hitler" en comparaison avec l'inclinaison du bras lors de ce salut de triste mémoire. Remarquez la ligule très courte, environ un demi-millimètre.


photo Claude Delhaise

Festuca pallens


photo Claude Delhaise

Polygonatum odoratum


photo André Smoos

Cotoneaster integerrimus

Ces trois espèces remarquables n'ont été vues qu'en un seul exemplaire sur cette partie gérée. Le Cotoneaster n'est pas encore repris dans la liste des espèces du carré IFBL.

Voilà un site « namurois » qui ne manque pas d'intérêt.

André Smoos.

André SMOOS

0032473614750 Mobile
003281441046 Domicile
andre.smoos@skynet.be

Rue de la Chapelle Lessire, 63
B-5020 Malonne (Namur)
Belgique