Mycologie

YVOIR - Tricointe
Le 13 octobre 2026

Guide : Jean-Jacques Cuvelier
Rapporteur : Patricia De Becker
Présents : 12 participants
Météo : temps gris et humide

Site visité :

Cette journée de prospection mycologique s'est déroulée dans le massif forestier de Tricointe, situé au nord d'Yvoir. Le site n'a pas été épargné par la sécheresse des derniers mois, le sol est dur, sec et il y a peu de champignons.

« Les peuplements feuillus sont essentiellement constitués de chênes, hêtres, frênes, charmes, érables. Les quelques parcelles de résineux sont à base d'épicéas, de mélèzes et de pins sylvestres. Ces diverses essences sont adaptées au sol particulier de la région, sur grès rouges du Burnotien. Les ronces et les fougères-aigles sont des témoins du caractère siliceux et acide du terrain. » (Extrait du panneau installé par la DNF à l'entrée de la réserve naturelle).





Sparassis crispa



Calocera viscosa



Parasola conopila

Le lieu-dit « chêne à l'image » :



Dans une petite clairière, au carrefour de quatre chemins forestiers, se dresse un chêne sessile remarquable par la circonférence de son tronc et l'ampleur de sa couronne, c'est le lieu-dit « Chêne à l'image », centre obligé de nombreuses promenades.
Une potale dédiée à la Vierge de Lourdes est accrochée à ce chêne et pourrait suffire à expliquer cette dénomination. Mais une autre version fait intervenir la ferveur populaire : pour implorer l'aide de la Vierge, des images saintes étaient insérées par les fidèles dans les fentes du tronc ou sous l'écorce incisée puis rabattue sur l'image. Certaines de ces images ainsi que des statuettes auraient été englobées par le tronc.
Ganoderma resinaceus s'est installé au pied du chêne ; la Vierge donnera peut-être à l'arbre la force de résister à cette attaque.

La liste des espèces rencontrées est mentionnée ci-dessous par ordre alphabétique (validée par Marc Paquay et Jean-Jacques Cuvelier)

Ampulloclitocybe clavipes	*Mycena galericulata*
Armillaria cepistipes	*Mycena polygramma*
Armillaria lutea	*Mycena vitilis*
Armillaria ostoyae	*Oligoporus tephroleucus*
Calocera cornea	*Parasola conopilea*
Calocera viscosa	*Parasola plicatilis*
Chlorociboria aeruginascens	*Paxillus involutus*
Clitocybe gibba	*Peniophora quercina*
Collybiopsis peronata	*Phellinus ferreus*
Collybiopsis quercophilus	*Pholiota sp.*
Crepidotus cesatii	*Piptoporus betulinus*
Cyathus striatus	*Pleurotus ostreatus*
Daedaleopsis confragosa	*Pleurotus pulmonarius*
Exidia glandulosa	*Pluteus cervinus*
Fomes fomentarius	*Polyporus tuberaster*
Fomitopsis pinicola	*Psathyrella auricomus*
Ganoderma resinaceum	*Radulomyces molaris*
Gymnopus dryophilus	*Russula fragilis*
Gymnopus fusipes	*Skeletocutis nivea*
Hygrophoropsis aurantiaca	*Sparassis crispa*
Hymenochaete rubiginosa	*Stereum hirsutum*
Hypholoma fasciculare	*Stereum rugosum*
Hypoxylon fuscum	*Trametes gibbosa*
Imleria badia	*Trametes hirsuta*
Junghuhnia nitida	*Trametes versicolor*
Laccaria laccata	*Trichaptum abietinum*
Laetiporus sulphureus	*Tyromyces chioneus*
Marasmius rotula	*Xylaria polymorpha*
Mollisia cinerea	*Xylodon paradoxus*



Radulomyces molaris