
Mycologie

Château de Fallais : inventaire mycologique dans le parc en matinée
Exposition et détermination après-midi
Braives - 11 novembre 2025

Guide : Jean-Jacques Cuvelier
Rapporteurs : Pascale Debras
Présents : 11 participants
Météo : nuageux à couvert et température agréable.

Description du site :
Le château de Fallais, situé dans la province de Liège, est un château-forteresse datant du 13ème siècle. Il reste un témoin du passé. Les restaurations du 19ème siècle ont conservé soigneusement les volumes du bâtiment féodal. Une partie du dispositif défensif initial de ce bel exemple de château-forteresse de plaine est toujours visible.








Le parc est une zone humide et inondable. Les douves sont alimentées par la Mehaigne et de petits ruisselets. C'est un milieu avec des intermittences d'humidité parfois trop importantes et parfois insuffisantes.
Le parc est géré par le propriétaire en prenant grand soin de conserver la biodiversité et de maintenir des zones d'habitats différents.
Nous n'avons parcouru que la partie herbeuse le long des douves, autour du château et une partie de l'allée bordée de très anciens saules tétards.

Récolte dans le parc :
La liste des espèces récoltées dans le parc est reprise ci-dessous.
Parmi cette récolte, l'*Amanita strobiliformis* ou Amanite solitaire (photos 1&2) présente un chapeau est charnu, blanc, recouvert de flocons verruqueux, la marge du chapeau n'est pas striée. Le pied se termine par un bulbe ovoïde formé de plusieurs bourrelets ; l'anneau, crémeux, placé très haut sur le pied, est accolé aux lamelles. Cette espèce est considérée comme rare en Wallonie et doit être protégée.









Volvopluteus gloiocephalus, la volvaire gluante (photo 3&4) se reconnaît facilement par sa taille imposante, son chapeau visqueux, bien que de couleur variable, et la large volve blanche qui enveloppe sa base. Contrairement aux amanites blanches avec lesquelles elle peut éventuellement être confondue, elle n'a pas d'anneau et ses lames rosissent avec l'âge. C'est un champignon présent sur tous les continents, qui pousse dans les milieux herbeux, en solitaire ou en groupe.

Exposition et récoltes apportées par les visiteurs :

Une exposition a été mis en place pour accueillir le public. La liste des espèces présentées est aussi reprise ci-dessous, les espèces récoltées le matin y étant également montrées.

Le public y était amené à prendre conscience de la grande diversité du monde mycologique et à s'initier aux critères et clés de détermination des champignons. Un panneau explicatif montrait également les confusions possibles entre des champignons qui se ressemblent et le danger y afférant si on veut les consommer.

Certains sont venus avec un panier de champignons à déterminer : Jean-Jacques, avec une approche toujours très pédagogique, a pu leur donner parfois le nom voire la comestibilité mais aussi parfois l'impossibilité d'une détermination car le prélèvement n'avait pas été effectué avec soin.

Listes des espèces récoltées dans le parc

NOMS D'ESPECES (dans le parc)	REMARQUES
Agaricus moelleri	
Agrocybe vervacti	*Voir note J.P. Legros en bas de page*
Amanita strobiliformis	
Armillaria mellea	
Ascocoryne sarcoides	
Bjerkandera adusta	
Chondrostereum purpureum	
Clitocybe dealbata	
Conocybe cf subovalis	
Coprinellus disseminatus	
Coprinellus micaceus	
Coprinopsis atramentaria	*syn. Coprinus atramentarius*
Coprinopsis melanthina	*Voir note J.J. Cuvelier en bas de page*
Coprinus sp.	
Exidia truncata	
Fomes fomentarius	
Ganoderma lipsiense	*syn. Ganoderma applanatum*
Helvella crispa	
Hygrophorus hypothejus	
Lepiota cristata	
Lepista glaucocana	
Leucocybe candicans	*anc. Clitocybe candicans*
Melanoleuca melaleuca	
Melanoleuco evenosa	*anc. Melanoleuco strictipes*
Mycena capillaris	
Paxillus involutus	
Phellinus sp.	

Pholiota squarrosa	
Pholiotina pygmaeoaffinis	
Pholiotina arrhenii	*syn. Conocybe arrhenii, avec anneau*
Pholiotina vestita	*syn. Conocybe vestita*
Psathyrella corrugis f. gracilis	
Psathyrella microrrhiza	
Psathyrella sp.	
Trametes versicolor	
Volvopluteus gloiocephalus	*anc. Volvariella gloioceplala*
Xylaria hypoxylon	

Note de J.P.Legros, *Agrocybe vervacti*: "J'ai examiné la petite récolte de ce que j'avais pronostiqué sur le terrain comme un très probable *agrocybe* eu égard au caractère ridulé et cabossé de la cuticule. Hésitant entre *A. arvalis* et *A. vervacti*, la microscopie a tranché et tout à fait confirmé *A. vervacti* (spores nettement plus petites et cheilos longuement lagéniformes). Macroscopiquement aussi cette détermination est bien conforme. Pour l'iconographie, je renvoie à Courtecuisse (n 1306) et surtout à la photo de Breitenbach (vol. 4, n 371) qui semble un copié-collé de ma récolte. Cette espèce est peu fréquente voire rare."
Note de J.J. Cuvelier : « Nous avons récolté un *Coprinopsis* en début de sortie ; il poussait à proximité d'un noyer. Il figurait dans le relevé comme *C. marescibilis* mais ce n'est pas lui car les spores que j'ai observées n'ont pas de pore germinatif. L'ensemble des caractères correspond bien avec *C. melanthina*. »

Noms d'espèces présentées à l'expo	**en plus des espèces récoltées**
Agaricus silvaticus	
Amanita rubescens	
Armillaria solidipes	
Auriscalpium vulgare	
Bolbitius vitellinus	*syn. Bolbitius titubans*
Clitocybe nebularis	
Cuphophyllus virgineus	
Geastrum michelianum	*syn. Geastrum triplex*
Gliophorus psittacinus	
Gymnopilus penetrans	
Hygrophorus pustulatus	
Hypholoma fasciculare	
Infundibulicybe geotropa	*syn. Clitocybe geotropa*
Laccaria laccata	
Lactarius camphoratus	

Lactarius controversus	
Lactarius quietus	
Mucilago crustacea	
Paxillus involutus	
Pluteus cervinus	
Russula fageticola	
Russula fellea	
Russula ochroleuca	
Xylaria hypoxylon	