Mycologie

Visite du bois de la Héronnerie à Lessive (Commune de Rochefort)
21 août 2025

Présents : Martine (Présidente), Pascale, Anne, Charlotte, Gisèle, Jean-François, Arlette Gelin, André Docquier, Geneviève
Guide : Marc Paquay

Le bois de la Héronnerie est un massif forestier ancien, essentiellement composé d'une chênaie-charmaie installée sur des sols argilo-calcaires avec, parfois, des passages un peu plus acides (schistes famenniens) comme en témoigne l'observation de la callune. Cette forêt, relativement préservée (elle mériterait de l'être plus !) contient de nombreux éléments fauniques et floristiques qui en font un site de grand intérêt biologique. Le règne fongique fait aussi partie de ce cortège de haut intérêt.
Notre sortie s'est déroulée dans des conditions de sécheresse assez fortes et de nombreux carpophores étaient secs et parfois méconnaissables ! Une poussée s'est apparemment produite vers le 10 août … Heureusement, il y avait encore des exemplaires relativement frais et nous avons noté une cinquantaine d'espèces de macromycètes principalement (voir liste ci-dessous, plus ou moins dans l'ordre d'apparition des observations).

Comparaison de différents Bolets.
Hemileccinum impolitum ou ***Boletus impolitus*** : chapeau velouté à feutré gris-beige, pore jaune clair et anneau en haut du pied. Forte odeur d'iode et pas de bleuissement. (Photos 1 & 2) De nombreux pieds de cette espèce rare ont été observés. Un autre exemplaire a été déterminé comme ***Hemileccinum depilatus*** ou ***Boletus depilatus*** (Photo 3) car sa couleur était plus foncée, le chapeau bosselé et le stipe un peu tordu mais avec la même odeur d'iode. Ces deux espèces se caractérisent par l'absence de réseau sur le stipe.


1


2


3


4

Par contre, un autre exemplaire, très sérieusement grignoté (Photo 4), a de prime abord été pris pour un *depilatus* en raison de la couleur du chapeau mais la présence d'un réseau sur le pied et l'odeur de noix à la coupe ont amené à la détermination de ***Butyriboletus appendiculatus*** ou ***Boletus appendiculatus***.

Une autre espèce de la même famille, ***Leccinellum crocipodium*** ou ***Leccinum crocipodium,*** a également été observée à de nombreuses reprises, caractérisé entre autres par son chapeau craquelé. (Photo 5)


5


6

Autre belle découverte : sur une branche morte, la présence de ***Polyporus tuberaster***.(Photo 6) Ce petit polypore brun-jaune a un chapeau à écailles pointues, la base du pied présente un feutrage. Il pousse directement sur des branches mais peuvent aussi être reliés à des pseudosclérotes en partie constitués de sol aggloméré.

Liste des espèces observées

Russula luteotacta	
Trametes versicolor	
Russula atropurpurea	
Russula viresccens	
Leccinum crocopodium	
Russula heterophylla	
Russula lepida	
Amanita spissa	
Russula vesca	
Laccaria laccata	
Stereum hirsutum	
Collybia peronata	
Boletus impolitus	syn. et nouveau nom : Hemileccinum Boletus impolitus, espèce R à RR sur sol peu calcaire, odeur d'iode caractéristique à la base du pied
Lactarius helvus	Odeur typique de curry
Collybia fusipes	
Abortiporus biennis	Sur le sol (sur racines ou bois enfoui)
Chlorocyboria aeruginascens	
Leccinum pseudoscabrum	syn. L. carpini
Russula violeipes	
Psathyrella candoleana	
Russula nigricans	
Stemonitis (axifera/fusca)	Myxomycète à sporocarpe brun-rouge, allongé et stipité, sur bois mort
Bulgaria inquinans	
Boletus appendiculatus	syn. et nouveau nom : Butyriboletus appendiculatus, espèce R sur sol argileux, sous chênes, odeur de noix à la coupe
Lactarius acerrimus	
Hypholoma fasciculare	
Russula vesca	
Lactarius fuliginosus	
Boletus aestivalis	
Russula olivacea	
Lactarius vellereus	
Amanita submembranacea	grosse plaque velaire sur le chapeau
Russula velutipes	syn. aurora
Tricholoma sejunctum	
Russula anthracina	
Russula chloroides	anneau bleuâtre près de l'insertion des lames
Stecherrinum ochraceum	
Xerocomus subtomentosus	
Xerula radicata	
Fuligo septica	
Pholiota tuberculosa	
Russula fragilis	petite, odeur "boîte en fer blanc" ou "bonbons anglais", pied opalescent, fragile, cuticule nettement séparable
Lactarius circellatus	sous charme, plus zoné que pyrogalus et lames plus serrées
Hebeloma sacchariolens	odeur sucrée caractéristique
Hapalopilus rutilans	réaction violette très vive à l'ammoniaque
Fomitopsis betulina	nouveau nom de Piptoporus betulinus
Schizopora paradoxa	
Phellinus ferruginosus	Ph.ferreus lui ressemble mais forme plus "en escalier" et plus régulier sur substrats verticaux

Russula foetens	
Entoloma sinuatum	syn. E. lividum
Russula (gr. xerampelina)	
Polyporus tuberaster	
Boletus depilatus	syn. et nouveau nom : Hemileccinum depilatus